



**A l'ASSAUT**  
**DU SIDA**   
**Grand Public**  
**QUESTIONNAIRE**  
**EDITION 2020**



## A PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce document comporte le questionnaire, les réponses et les conseils qui servent de contenu pour la plateforme AADS. On y trouve deux formats de questions :

- Le format **VRAI/FAUX** (le joueur devra choisir en répondant par VRAI ou FAUX)
- Le format **Choix multiples** (il y a trois éléments de réponses proposées avec seulement une réponse correcte).

Il faut noter que parfois les réponses à certaines questions sont accompagnées de conseils afin d'expliquer davantage, ou donner des informations complémentaires, dans l'objectif de rester fidèle à la ligne éducative qu'exige cette plateforme.

Enfin il faudrait rappeler que cette mise en forme du contenu a été ainsi élaborée, pour faciliter l'intégration technique du contenu sur les différentes versions web et mobile de AADS.

### DEFINITION DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS :

**N** : Numérotation des questions

**F** : pour le type de Format des questions. (0 Format VRAI/FAUX ; 1 format Choix multiples.)

**QUESTION**

**C1, C2, C3** : pour les choix de réponses. (Choix 1, Choix 2 ou Choix 3)

**BR** : Bonne Réponse

**CONSEIL**

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
<b>PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES IST</b>							
1.	1	IST signifie...	Infection Sexuellement Transmissible	Information Sexuelle Transmissible	Inflammation Sexuelle Transmissible	1	Une IST se transmet entre partenaires au cours des rapports sexuels non protégés.
2.	1	Les IST sont une porte d'entrée pour le VIH car...	elles provoquent des lésions qui favorisent l'entrée du VIH dans l'organisme	elles sont la preuve d'un manque d'hygiène	elles ne se guérissent pas	1	Avoir une IST c'est avoir pris le même risque de contamination par le VIH. consulte immédiatement un agent de santé.
3.	0	La stérilité est une conséquence possible d'une IST non traitée ou mal traitée	VRAI	FAUX		VRAI	Si tu as une IST consulte immédiatement un agent de santé.
4.	0	L'infertilité peut être une conséquence d'une IST non traitée ou mal traitée	VRAI	FAUX		VRAI	On peut naître stérile mais l'infertilité survient généralement après une IST mal traitée
5.	0	En cas d'IST, tous les partenaires sexuels doivent être informés et bénéficier d'un traitement	VRAI	FAUX		VRAI	L'IST s'attrape à deux mais se traite à plusieurs (Traiter en même temps tous les partenaires sexuels possible pour rompre la chaîne de transmission de l'infection).
6.	0	En cas d'IST, il faut faire son test de dépistage du VIH	VRAI	FAUX		VRAI	Avoir une IST c'est avoir pris le même risque de contamination par le VIH. Fais-toi dépister
7.	0	En cas d'IST, il faut suivre les conseils et observer le traitement prescrit par le prestataire de santé jusqu'à la fin	VRAI	FAUX		VRAI	...pour une guérison totale
8.	0	En cas d'IST, il faut arrêter la consommation d'alcool pendant le traitement	VRAI	FAUX		VRAI	La consommation d'alcool est strictement interdite pendant le traitement des IST. Pour une bonne guérison, il faut respecter les conseils de l'agent de santé. En effet l'alcool peut exagérer les effets indésirables des médicaments ou détruire le médicament.
9.	0	Les IST s'accompagnent obligatoirement de symptômes	VRAI	FAUX		FAUX	Toutes les IST ne présentent pas toujours de signes visibles. Consulte un agent de santé en cas de comportements à risque

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
10.	1	Les maladies suivantes sont des IST sauf...	la gonococcie	la pneumonie	l'hépatite virale B	2	La pneumonie est une infection pulmonaire. Elle ne se transmet pas par voie sexuelle.
11.	1	Les maladies suivantes sont des IST sauf...	la tuberculose	l'infection à VIH	la syphilis	1	La tuberculose est la plus fréquente infection opportuniste liée au VIH. Mais elle n'est pas une IST.
12.	0	Aucune IST ne se guérit	VRAI	FAUX		FAUX	Certaines IST se guérissent
13.	0	Une IST peut entraîner des douleurs abdominales basses (douleurs dans le bas ventre)	VRAI	FAUX		VRAI	Les pertes blanches (leucorrhées), les démangeaisons du sexe, les mauvaises odeurs sont synonymes de maladies. Non traitée elles peuvent entraîner des douleurs abdominales basses qui traduisent une aggravation de la maladie. De même que certaines douleurs lors des rapports sexuels
14.	0	Une IST peut entraîner des douleurs testiculaires	VRAI	FAUX		VRAI	Les écoulements, les démangeaisons dans le sexe, la sensation de brûlure en urinant sont synonyme de maladies. Non ou mal traitée cela peut entraîner des douleurs testiculaires traduisant une aggravation de la maladie.
15.	0	Certaines IST peuvent entraîner la fièvre et la fatigue	VRAI	FAUX		VRAI	Oui, telles que la douleur testiculaire et la douleur abdominale basse
16.	0	Une IST peut entraîner des démangeaisons et/ou une gêne, et/ou picotement des brûlures au niveau des organes génitaux	VRAI	FAUX		VRAI	Consulte rapidement un agent de santé
17.	0	Une IST peut entraîner la sensation de brûlure en urinant	VRAI	FAUX		VRAI	Consulte rapidement un agent de santé
18.	0	Une IST peut entraîner des écoulements anormaux au niveau des organes génitaux	VRAI	FAUX		VRAI	Consulte rapidement un agent de santé

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
19.	0	Une IST peut entraîner des petits boutons ou verrues au niveau des organes génitaux	VRAI	FAUX		VRAI	Consulte rapidement un agent de santé
20.	0	Une IST peut entraîner des plaies sur les organes génitaux	VRAI	FAUX		VRAI	
21.	0	L'infection à VIH est une IST	VRAI	FAUX		VRAI	
22.	1	Parmi ces maladies, laquelle est une IST ?	la tuberculose	la syphilis	la pneumonie	2	
23.	0	Les IST se contractent principalement lors des rapports sexuels non protégés	VRAI	FAUX		VRAI	L'utilisation systématique et correcte du préservatif à chaque rapport sexuel permet d'éviter les IST.
24.	0	Lorsqu'une personne contracte une IST, aucun signe n'apparaît chez cette personne jusqu'à sa mort	VRAI	FAUX		FAUX	
25.	0	En cas d'IST, il faut arrêter systématiquement les rapports sexuels	VRAI	FAUX		VRAI	<b>Effectivement ! Cela permet d'éviter une nouvelle infection et couper la chaîne de transmission.</b>
26.	0	En cas de signes d'IST, il faut consulter immédiatement un agent de santé	VRAI	FAUX		VRAI	...car les IST constituent un danger. De plus, elles sont une porte d'entrée de l'infection à VIH.
27.	0	En cas d'IST, il faut éviter l'automédication	VRAI	FAUX		VRAI	Si tu as une IST consulte immédiatement un agent de santé pour des soins appropriés.
28.	1	En cas d'IST je dois...	consulter un agent de santé	voir un marabout	acheter des médicaments dans la rue	1	
<b>PREVENTION DE L'INFECTION A VIH</b>							
29.	1	VIH signifie...	Virus de l'Immunocompétence Humaine	Virus de l'Immunodéficiência Humaine	Virus Immunodépresseur Humain	2	Le VIH affaiblit le système immunitaire et conduit à terme au sida (la phase maladie.)
	1	PVVIH signifie	Population Vivant avec le VIH	Personne Vivant avec le VIH	Personne Victime de VIH	2	
31.	1	PIAVIH signifie	Personne Identifiée Affectée par le VIH	Prévention des Infections et des Affections du VIH	Personne Infectée et/ou Affectée par le VIH	3	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
32.	1	SIDA signifie...	Syndrome Immunodéficitaire Accumulé	Syndrome Imaginaire pour Décourager les Amoureux	Syndrome d'immunodéficience acquise	3	L'infection à VIH peut évoluer vers la maladie du Sida si le traitement n'est pas suivi.
33.	1	Une personne infectée par le VIH s'appelle aussi...	Une personne immunodéficitaire	Une personne séronégative	Une personne séropositive	3	
34.	1	IO signifie...	Infection Opportuniste	Infection Ordinaire	Infection Officielle	1	C'est une infection due à des microbes peu agressifs mais qui deviennent virulents avec l'infection à VIH.
35.	1	OEV signifie...	Orphelins et enfants vulnérables	Orphelins et autres enfants rendus vulnérables	Organisation des enfants vulnérables	1	
36.	1	Le VIH est un(e)...	Virus	bactérie	parasite	1	Rappelle-toi que VIH signifie Virus de l'Immunodéficience Humaine!
37.	1	Parmi ces pratiques, laquelle peut transmettre le VIH ?	Embrasser son partenaire	S'enlacer	Avoir des rapports sexuels non protégés	3	
38.	0	Se faire tatouer peut constituer un risque d'infection à VIH	VRAI	FAUX		VRAI	Evite tout contact avec les objets tranchants ou piquants souillés de sang non désinfectés ou non stérilisés !
39.	0	Un seul rapport sexuel non protégé suffit pour contracter le VIH	VRAI	FAUX		VRAI	Tout rapport sexuel non protégé est un risque d'infection à VIH ! Utilise donc systématiquement et correctement le préservatif à chaque rapport sexuel.
40.	1	Quels sont les liquides biologiques par lesquels se transmet le VIH?	la sueur, le mucus, les larmes	le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel	l'urine, le suc gastrique, la bile	2	
41.	1	Combien de voies de transmission à VIH existe-t-il ?	10	5	3	3	Le VIH se transmet par les voies : sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant.
42.	1	Quelles sont les voies de transmission du VIH ?	la voie sexuelle, la voie sanguine, de la mère à l'enfant	le toucher, la voie respiratoire, le voisinage	l'accolade, la voie respiratoire, la baignade	1	
43.	0	Le VIH peut se transmettre par le sexe oral (tout contact entre la bouche et le sexe)	VRAI	FAUX		VRAI	
44.	1	Une blessure par une lame souillée de sang infecté transmet le VIH par la voie...	sanguine	de la mère à l'enfant	sexuelle	1	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
45.	1	La pénétration anale sans protection est un acte sexuel...	sans risque d'infection à VIH	à encourager	A haut risque d'infection à VIH	3	Tout rapport sexuel non protégé est à un risque d'infection à VIH ! Utilise donc systématiquement et correctement le préservatif à chaque rapport sexuel.
46.	1	Lequel des liquides biologiques suivants peut-il transmettre le VIH?	les larmes	le sperme	la sueur	2	Les autres liquides biologiques qui transmettent le VIH sont : le sang, les sécrétions vaginales, le lait maternel, le liquide amniotique.
47.	0	L'infection à VIH peut se contracter pendant le premier rapport sexuel	VRAI	FAUX		VRAI	Tout rapport sexuel non protégé est un acte à risque d'infection à VIH.
48.	1	L'infection à VIH peut se contracter au cours du premier rapport sexuel si on...	n'utilise pas de préservatif	n'utilise pas de lubrifiant	n'est pas amoureux	1	Seule l'utilisation systématique et correcte du préservatif permet d'éviter les IST, le VIH et le Sida.
49.	0	On peut mettre de côté un préservatif avec un emballage déjà ouvert et le réutilisé plus tard	VRAI	FAUX		FAUX	Le préservatif une fois ouvert doit être immédiatement utilisé ou jeté !
50.	0	On peut utiliser de l'huile ou le beurre de karité comme lubrifiant pour le préservatif	VRAI	FAUX		FAUX	N'utilise jamais de l'huile ou le beurre de karité comme lubrifiant! Au besoin, achète un lubrifiant en pharmacie. <b>Nb : le préservatif est vendu lubrifié.</b>
51.	0	La salive est un lubrifiant naturel pour les rapports sexuel	VRAI	FAUX		FAUX	N'utilise jamais la salive comme lubrifiant! Achète un lubrifiant en pharmacie.
52.	0	On peut contracter le VIH en se coupant avec une lame souillée de sang	VRAI	FAUX		VRAI	Evite tout contact avec les objets tranchants ou piquants souillés de sang, non désinfectés ou non stérilisés. <b>Nb : aie tes objets d'usage personnel</b>
53.	0	On peut contracter le VIH en embrassant son ou sa partenaire	VRAI	FAUX		FAUX	
54.	1	Le VIH peut se transmettre par...	les piqûres d'insectes	la salive	les sécrétions vaginales	3	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
55.	0	L'utilisation commune d'une brosse à dents peut transmettre le VIH	VRAI	FAUX		VRAI	La brosse à dents est à usage strictement personnel du fait des saignements qui peuvent survenir lors de son utilisation.
56.	0	L'utilisation commune d'un rasoir peut transmettre le VIH	VRAI	FAUX		VRAI	Le rasoir est à usage strictement personnel du fait des coupures pouvant entraîner des saignements lors de son utilisation.
57.	0	L'utilisation commune d'une lame peut transmettre le VIH	VRAI	FAUX		VRAI	La lame est à usage strictement personnel du fait des coupures pouvant entraîner des saignements lors de son utilisation.
58.	1	Un des avantages de connaître son statut sérologique c'est...	se protéger et protéger son entourage	avoir des comportements à risques sans conséquences	avoir plusieurs rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires	1	Il est préférable de connaître son statut sérologique pour bénéficier des conseils de l'agent de santé.
59.	1	On peut se procurer des préservatifs dans les lieux suivants :	restaurant, piscine, spa	pharmacie, hôpital, médico scolaire, supermarché, boutique, tablier, boîte de nuit	librairie et cantine scolaire	2	
60.	0	On peut acheter des préservatifs à partir de 125 FCFA	VRAI	FAUX		VRAI	
61.	1	Parmi les méthodes de contraception suivantes, laquelle protège contre le VIH ?	La pilule contraceptive	Le préservatif masculin ou féminin	La pilule du lendemain	2	
62.	1	La méthode de protection contre les IST, le VIH et les grossesses non désirées c'est...	l'utilisation d'une pilule contraceptive	l'utilisation correcte du préservatif	la prise de la pilule du lendemain	2	Les pilules contraceptives et les pilules du lendemain ne permettent pas d'assurer la double protection parce qu'elles protègent seulement des grossesses non désirées.
63.	1	Un exemple de comportement à risque d'infection à VIH c'est...	avoir un rapport sexuel non protégé	manger avec une personne séropositive	saluer une personne séropositive	1	Utilise systématiquement et correctement le préservatif !
64.	1	Un exemple de comportement à risque d'infection à VIH c'est...	Dormir dans le même lit qu'une personne séropositive	Avoir un rapport génito-anal sans préservatif	Utiliser les mêmes toilettes qu'une personne séropositive	2	Utilise systématiquement et correctement le préservatif pour tous types de rapports sexuels.
65.	1	Un exemple de comportement à risque d'infection à VIH c'est...		Faire un câlin à une personne séropositive	Avoir un rapport sexuel protégé	1	



N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
			Utiliser le même matériel tranchant et piquant qu'une personne infectée				
66.	1	Un exemple de comportement à risque d'infection à VIH, c'est...	Avoir des rapports sexuels protégés au cours des règles	Avoir plusieurs rapports sexuels protégés	Avoir des rapports sexuels non protégés au cours des règles	3	
67.	0	Le préservatif protège contre les grossesses précoces	VRAI	FAUX		VRAI	
68.	1	Le préservatif protège contre...	Les IST, le VIH et les grossesses non désirées	Le paludisme et la fièvre typhoïde	La varicelle et les allergies	1	
69.	1	Le moyen le plus sûr de se protéger du VIH, est...	L'abstinence	Le coït interrompu	Les rapports sexuels avec un seul partenaire	1	L'abstinence est le moyen le plus sûr de se protéger des IST, du VIH et des grossesses non désirées.
70.	0	L'utilisation du préservatif est le seul moyen de prévention du VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Il existe d'autres moyens de prévention tels que l'abstinence.
71.	0	Quand des partenaires sexuels sont séronégatifs, ils peuvent se passer du préservatif	VRAI	FAUX		FAUX	le risque de contamination est permanent ; Etre séronégatif ne garantit pas ta protection contre les IST, le VIH et le Sida. Utilise toujours le préservatif !
72.	0	Une fille vierge peut avoir des rapports non protégés et ne pas attraper le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	On peut contracter le VIH lors du premier rapport sexuel s'il n'est pas protégé.
73.	1	Le lubrifiant du préservatif sert à...	Réduire la friction pendant les rapports sexuels et les rendre plus faciles	Réutiliser le même préservatif	À empêcher la pénétration des virus et des bactéries qui causent les IST	1	Le lubrifiant réduit le risque de rupture du préservatif
74.	1	Les lubrifiants adaptés aux préservatifs en latex sont à base...	D'eau	De vaseline	beurre de karité	1	Le lubrifiant recommandé est celui à base d'eau
75.	1	La plupart des préservatifs masculins sont faits de...	silicone	Résine	latex	3	Si vous êtes allergiques au latex, il en existe en d'autres matières telles que la polyuréthane
76.	0	Il existe des préservatifs féminins	VRAI	FAUX		VRAI	Le préservatif féminin est une alternative efficace au préservatif masculin surtout en cas d'allergies au latex.

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
77.	1	Un avantage du préservatif féminin c'est...	De permettre à la femme d'avoir plus de contrôle sur sa santé sexuelle	D'éviter les menstrues	De l'utiliser deux à trois fois	1	
78.	1	Un avantage du préservatif féminin c'est d'éviter ...	Le cancer du col de l'utérus	Les allergies	Les menstrues	2	Effectivement le préservatif féminin est en polyuréthane moins allergisant que le latex.
79.	0	Tout rapport sexuel non protégé est un rapport à risque	VRAI	FAUX		VRAI	L'utilisation systématique et correcte du préservatif permet d'éviter l'infection à VIH.
80.	1	Quels sont les différents types de préservatifs disponibles ?	Masculins uniquement	Féminins uniquement	Masculins et Féminins	3	
81.	1	Le meilleur endroit pour conserver un préservatif en bon état c'est...	La poche du pantalon	Un endroit frais et sec	Le réfrigérateur ou le congélateur	2	Eviter de mettre le préservatif dans les poches arrières
82.	0	L'utilisation du préservatif se négocie entre partenaires	VRAI	FAUX		VRAI	Un rapport sexuel non protégé n'est pas une preuve d'amour. Utilise le préservatif à chaque rapport sexuel
83.	0	L'utilisation d'objets tranchants ou piquants bien désinfectés protège du VIH	VRAI	FAUX		VRAI	Evite tout contact avec les objets tranchants ou piquants souillés de sang non désinfectés ou non stérilisés.
84.	0	L'utilisation correcte et systématique du préservatif ne protège pas efficacement contre le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	protégez-vous ! Le sida se moque des apparences
<b>DEPISTAGE</b>							
85.	1	CDV signifie :	Communication pour le Dépistage Volontaire	Conseil Dépistage Volontaire	Conseil Dépistage du VIH	2	Le test VIH est volontaire, gratuit, anonyme et confidentiel.
86.	1	CDIP signifie :	Conseil Dépistage Intégré par les Patients	Conseil Dépistage Initié par le Prestataire	Conseil Dépistage Intégré au Partenariat	2	C'est le test VIH conseillé par l'agent de santé au cours d'une consultation médicale.
87.	0	Une personne dépistée séronégative au test du VIH l'est pour la vie	VRAI	FAUX		FAUX	Evite les comportements à risques surtout après un test de VIH négatif pour le conserver.
88.	0	On vit mieux en ignorant son statut sérologique	VRAI	FAUX		FAUX	Il est préférable de connaître son statut sérologique pour bénéficier des conseils de l'agent de santé.

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
89.	1	Un des avantages à connaître son statut sérologique c'est...	Se permettre d'avoir des rapports sexuels non protégés	Bénéficier d'un suivi médical pour une meilleure santé si le test VIH est positif	Se permettre d'avoir plusieurs partenaires sexuels	2	
90.	1	Si ton test de dépistage du VIH est positif, cela veut dire que...	tu es d'un groupe sanguin positif	tu es séropositif au VIH	tu es stérile	2	
91.	0	Le test de dépistage du VIH se fait avec une goutte de sang prélevée au bout du doigt	VRAI	FAUX		VRAI	
92.	1	A quel âge peut-on faire le dépistage du VIH sans l'autorisation d'un parent en Côte d'Ivoire ?	A 12 ans révolus	A 15 ans révolus	A 16 ans révolus	3	Toute personne âgée d'au moins 16 ans révolus a le droit de se faire dépister pour le VIH (Art.3 de la Loi VIH en CI)
93.	1	Un résultat négatif du test de dépistage du VIH signifie que la personne ...	est indemne de toute infection	n'a pas d'IST	n'a pas le VIH dans le sang	3	
94.	1	Pourquoi fait-on son test de dépistage du VIH?	Pour savoir si on est séropositif ou séronégatif au VIH	Pour avoir plusieurs partenaires sexuels	Pour connaître sa charge virale	1	Il est préférable de connaître son statut sérologique pour bénéficier des conseils de l'agent de santé.
95.	1	Qui peut se faire dépister du VIH?	Seulement les adultes	Tout le monde (adultes, jeunes, adolescents et enfants)	Seulement les femmes enceintes	2	Tout le monde peut se faire dépister, cependant les mineurs de moins de 16 ans ont besoin d'une autorisation parentale.
96.	0	Le test de dépistage du VIH est gratuit en Côte d'Ivoire	VRAI	FAUX		VRAI	Le test est gratuit dans les centres de santé publics et certaines cliniques privées
97.	0	Le test de dépistage du VIH est obligatoire en Côte d'Ivoire	VRAI	FAUX		FAUX	Le test de dépistage du VIH est volontaire, gratuit, anonyme et confidentiel.
98.	0	Le dépistage de l'infection à VIH permet de découvrir d'autres infections dans le sang	VRAI	FAUX		FAUX	
99.	0	le Personnel de santé de l'entreprise peut révéler votre statut à votre responsable.	VRAI	FAUX		FAUX	Aucun personnel de santé n'a pas le droit de communiquer à l'employeur le statut de séropositivité d'un salarié ou

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL	
							d'un postulant à l'embauche. (Art .31 de la Loi VIH )	
100.	0	L'agent de santé a le droit de faire le test du VIH à son client sans son consentement	VRAI	FAUX			Le test de dépistage du VIH est volontaire, gratuit, anonyme et confidentiel (voir article 46 de la Loi VIH)	
101.	0	L'agent de santé a le droit d'annoncer le statut positif aux partenaires sexuels au bout de 3 mois si celui-ci ne le fais pas	VRAI	FAUX			Pour plus d'information, consultez l'article 12 de la loi VIH	
102.	0	Le dépistage du VIH permet de connaître son groupe sanguin	VRAI	FAUX			Il permet plutôt de savoir si on est séropositif ou séronégatif au VIH	
103.	1	Le résultat du test de dépistage du VIH est...	Mi- positif ou mi- négatif	Soit positif ou négatif	À la fois positif et négatif	2		
104.	0	Le test de dépistage du VIH donne deux résultats possibles : positif ou négatif	VRAI	FAUX			VRAI	
105.	0	Une personne dépistée séronégative au test du VIH l'est pour la vie	VRAI	FAUX			FAUX	Evite les comportements à risques, même après un test de VIH négatif, pour le conserver.
106.	1	Où peut-on faire son test de dépistage ?	dans un centre de santé	chez le guérisseur traditionnel	chez le marabout	1	Tu peux faire ton test à l'hôpital, au médico-scolaire, dans une clinique ou un centre de dépistage communautaire.	
107.	0	Le dépistage de l'infection à VIH permet de découvrir d'autres infections dans le sang	VRAI	FAUX			FAUX	
<b>TRAITEMENT</b>								
108.	1	ARV signifie :	Antirétroviraux	Auto Réparation Virale	Anti Remède du Virus	1	Ce sont des médicaments prescrits aux personnes infectées, ils empêchent l'évolution de l'infection à VIH et leurs permettent d'être en bonne santé	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
109.	0	Les ARV réduisent efficacement la transmission du VIH d'une mère à son enfant	VRAI	FAUX		VRAI	Si la femme enceinte respecte bien le traitement, elle a toutes les chances d'avoir un enfant séronégatif
110.	0	Une personne vivant avec le VIH sous traitement ARV a une espérance de vie normale	VRAI	FAUX		VRAI	Sous traitement ARV, elle peut vivre normalement et aussi longtemps qu'une personne non infectée par le VIH.
111.	0	La charge virale est le nombre de globules blancs dans le sang	VRAI	FAUX		FAUX	La charge virale, c'est plutôt la quantité de virus par millilitre de sang
112.	1	Le traitement ARV post-exposition au VIH a une durée de...	1 semaine	1 mois	2 mois	2	Ce traitement est prescrit en cas d'accidents d'exposition au VIH. Exemple le viol.
113.	1	L'observance au traitement ARV signifie prendre ses médicaments ...	en cas de maladie	régulièrement et à des heures précises	de temps en temps	2	Les ARV sont à prendre régulièrement et sans arrêt afin d'améliorer sa santé.
114.	0	Les ARV sont gratuits en Côte d'Ivoire	VRAI	FAUX		VRAI	Les ARV sont <b>GRATUITS</b> dans les centres de prise en charge publics et certaines cliniques privés
<b>VBG</b>							
115.	1	VBG signifie...	Violence Basée sur les Garçons	Viol Basé sur le Genre	Violence Basée sur le Genre	3	
116.	0	Toute personne victime de violences sexuelles bénéficie de la prophylaxie post exposition.	VRAI	FAUX		VRAI	La prophylaxie post exposition consiste à mettre la victime sous traitement ARV pendant 1 mois. Tu peux te référer à la loi VIH Article 27
117.	0	On appelle violence basée sur le genre toute domination sur une personne en raison de son âge	VRAI	FAUX		FAUX	Pas du tout ! la violence basée sur le genre c'est tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe.
118.	0	Le port de vêtements moulants, osés ou révélateurs, justifie le viol	VRAI	FAUX		FAUX	Il faut être capable de maîtriser ses désirs sexuels et respecter le choix des autres car le viol est un crime puni par la loi.
119.	0	Les attouchements non désirés sont des formes d'agression sexuelle	VRAI	FAUX		VRAI	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
120.	0	Le mariage précoce ou forcé n'est pas un cas de violences basées sur le genre	VRAI	FAUX		FAUX	Bien au contraire ! Il constitue un cas de VBG parce qu'il n'a pas le consentement de la mariée
121.	1	Le viol désigne...	toute pénétration vaginale, anale et buccale sans consentement	un baiser consenti	des attouchements consentants	1	Le viol est un crime et est sévèrement puni par la loi.
122.	0	La consommation de drogue et d'alcool est un facteur favorisant les violences basées sur le genre	VRAI	FAUX		VRAI	Effectivement, leur consommation diminue la lucidité et la maîtrise de soi, ce qui peut inciter à la violence. Évite-les...
123.	0	Le viol augmente le risque d'infection à VIH	VRAI	FAUX		VRAI	En cas de viol il faut immédiatement consulter un professionnel de la santé.
<b>SANTE DE LA REPRODUCTION</b>							
124.	1	La pilule contraceptive protège contre...	les IST et le VIH	les grossesses non désirées	les menstrues douloureuses	2	La pilule empêche les grossesses non désirées mais ne protège pas contre les IST et le VIH.
125.	1	La contraception d'urgence est...	une alternative à la contraception orale quotidienne	la pilule du lendemain	un antibiotique	2	La pilule du lendemain s'utilise quand une femme a eu un rapport non protégé dans sa période d'ovulation.
126.	0	Aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%	VRAI	FAUX		FAUX	L'abstinence est la seule méthode de contraception naturelle. Elle est fiable à 100%!
127.	1	La pilule du lendemain fonctionne en...	retardant, bloquant ou perturbant l'ovulation	tuant les spermatozoïdes	accélérant l'ovulation	1	C'est une contraception d'urgence.
128.	1	La contraception est...	l'ensemble des moyens d'éviter le VIH	l'ensemble des moyens d'éviter une grossesse	l'ensemble des moyens d'éviter une IST	2	La contraception sert à éviter les grossesses, mais ne protège pas contre l'infection à VIH et les autres IST.
129.	1	Une grossesse précoce est contractée...	avant l'âge de 18 ans	en dehors du mariage	après son premier rapport sexuel	1	
130.	0	Une jeune fille peut obtenir la pilule contraceptive sans ordonnance	VRAI	FAUX		FAUX	Il faut toujours consulter au préalable un agent de santé (sage-femme, gynécologue...)
131.	0	La pilule du lendemain peut s'obtenir en pharmacie sans ordonnance	VRAI	FAUX		FAUX	Bien que la pilule du lendemain soit délivrée dans des pharmacies sans ordonnance la norme voudrait qu'elle soit vendue sous présentation d'une

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
							ordonnance en bonne et due forme.
132.	0	La pilule contraceptive rend stérile à long terme	VRAI	FAUX		FAUX	
133.	1	Les conseils sur les moyens de contraception s'obtiennent...	chez un camarade	auprès d'un agent de santé	dans la rue	2	
<b>PTME</b>							
134.	1	Si une mère infectée allaite son enfant, elle peut lui transmettre le VIH par la voie...	Sexuelle	de la mère à l'enfant	sanguine	2	Une mère infectée peut éviter de transmettre le VIH à son enfant en prenant correctement son traitement ARV et ce, depuis le début de la grossesse et pendant l'allaitement
135.	0	Une femme enceinte infectée par le VIH peut transmettre le virus à son bébé	VRAI	FAUX		VRAI	Les moments de la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont les périodes de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement.
136.	1	Une femme séropositive peut transmettre le VIH à son enfant...	en le faisant vacciner	en le mettant au dos	en l'allaitant	3	Une mère infectée peut éviter de transmettre le VIH à son enfant en prenant correctement son traitement ARV et ce, depuis le début de la grossesse et pendant l'allaitement
137.	1	Une femme séropositive peut transmettre le VIH à son enfant...	lors des consultations prénatales	pendant la grossesse	en prenant des médicaments	2	Une mère infectée peut éviter de transmettre le VIH à son enfant en prenant correctement son traitement ARV et ce, depuis le début de la grossesse et pendant l'allaitement
138.	1	Une femme séropositive peut transmettre le VIH à son enfant...	pendant l'accouchement	en prenant des médicaments	en le faisant vacciner	1	Une mère infectée peut éviter de transmettre le VIH à son enfant en prenant correctement son traitement ARV et ce, depuis le début de la grossesse et pendant l'allaitement
139.	0	Le conjoint d'une femme enceinte infectée n'est pas obligé de connaître son statut sérologique	VRAI	FAUX		FAUX	La connaissance du statut du conjoint lui permet de s'impliquer dans le suivi du couple mère-enfant afin d'éviter la transmission du VIH à leur enfant

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
140.	0	Un enfant né d'une mère séropositive n'a aucune chance de naître sans le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Bien au contraire ! L'enfant a toutes les chances de naître sans le VIH si la mère infectée prend correctement son traitement ARV et ce, depuis le début de la grossesse et pendant l'allaitement
141.	0	Un enfant né d'une mère infectée doit être dépisté précocement avant l'âge de 2 mois	VRAI	FAUX		VRAI	Le dépistage précoce permet une prise de décision adéquate pour le suivi de l'enfant. En effet, si l'enfant est infecté malgré le traitement ARV de la mère, cela permet la mise précoce sous traitement ARV pédiatrique
142.	0	Une femme séropositive doit planifier sa grossesse	VRAI	FAUX		VRAI	Le moment indiqué pour la grossesse chez une femme séropositive est la période où la charge virale est basse (charge inférieure à 1000 copies)
<b>STIGMATISATION ET DISCRIMINATION</b>							
143.	0	Refuser des soins à un client que l'on croit ou que l'on sait être séropositif est une violation des droits humains du client.	VRAI	FAUX		VRAI	Tout le monde a droit aux mêmes soins de santé en dépit de son statut sérologique
144.	0	Les Personnes Vivants avec le VIH (PVVIH) détenus ne bénéficient pas de prise en charge globale.	VRAI	FAUX		FAUX	Tout être humain a droit à la santé. Tu peux te référer à l'article 26 de la loi VIH pour plus d'information.
145.	0	Les Personnes Vivants avec le VIH (PVVIH) n'ont pas accès à l'emploi	VRAI	FAUX		FAUX	Tu peux te référer à l'article 52 pour plus d'information.
146.	0	La stigmatisation et la discrimination d'une personne du fait de son statut sérologique et ou de son appartenance à un groupe vulnérable est punie par la loi.	VRAI	FAUX		VRAI	Tu peux te référer à l'article 18 de la loi VIH pour plus d'information (Site ou page Facebook du PNLS)



N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
147.	0	Un employé peut être licencié s'il est séropositif au VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Au contraire cela constitue une rupture abusive du contrat de travail et est passible de poursuite à l'encontre de l'employeur. (Art 33 de la Loi VIH)
148.	0	Une personne malade, a les mêmes droits qu'une personne en bonne santé	VRAI	FAUX		VRAI	Le droit à la santé est un droit relatif aux droits humains et accordé à tout le monde
149.	1	Pour éviter la stigmatisation, le personnel de santé doit :	traiter tous les clients d'une manière respectueuse et accueillante	Insulter les clients qu'ils soupçonnent d'être séropositifs	Réserver un mauvais accueil aux professionnels du sexe	1	Un bon accueil des clients permet aux clients de se sentir en confiance et facilite l'accès aux soins de santé
150.	0	Les Personnes Vivant avec le VIH sont des personnes immorales.	FAUX	VRAI		FAUX	
151.	1	Pour éviter la stigmatisation et la discrimination, le personnel de santé doit :	Indexer les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.	Créer des compartiments pour les personnes séropositives	Eviter de créer des zones séparées pour les clients qu'il sait ou croit séropositifs et garantir la confidentialité des informations	3	La stigmatisation et la discrimination sont des facteurs de nuisance aux Personnes Vivant avec le VIH.
152.	0	La stigmatisation et la discrimination dans les centres de santé affectent l'accès aux soins de santé	FAUX	VRAI		VRAI	
153.	0	La discrimination désigne le traitement injuste fait à une personne au motif de son statut sérologique réel ou supposé	VRAI	FAUX		VRAI	Tout le monde a les mêmes droits.
154.	0	Soutenir une personne séropositive est une preuve d'amour	FAUX	VRAI		VRAI	Soutenir une personne malade est effectivement une preuve de l'attachement qu'on lui témoigne.
155.	0	Une personne séropositive doit être montrée du doigt et rejetée de tous	VRAI	FAUX		FAUX	Une personne séropositive a besoin du soutien et de l'accompagnement des proches pour l'aider à supporter la maladie.

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
156.	0	On doit éviter d'acheter des légumes à un commerçant qu'on soupçonne d'être infecté	FAUX	VRAI		FAUX	
157.	0	Une femme infectée est une honte pour sa famille et doit être repudiée par son époux	FAUX	VRAI		FAUX	Le soutien des proches est crucial pour permettre au malade d'accepter son statut et d'être observant
158.	1	On peut aider une personne séropositive en :	L'isolant et lui refusant tout contact avec les autres	L'accompagnant à ces rendez-vous médicaux et en la soutenant.	En informant l'entourage de son statut sérologique	2	L'accompagnement permet de garantir un bon suivi du traitement
<b>QUESTIONS SPECIFIQUES &amp; IDEES FAUSSES</b>							
159.	0	Les IST se contractent en utilisant les toilettes publiques	VRAI	FAUX		FAUX	Les IST se contractent principalement par des rapports sexuels non protégés.
160.	0	Un bain après un rapport sexuel non protégé permet d'éviter l'infection à VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Seule l'utilisation systématique et correcte du préservatif permet d'éviter les IST, le VIH et le Sida.
161.		Contaminer volontairement un ou plusieurs partenaires se sachant séropositif au VIH est punie d'une peine d'emprisonnement.	VRAI	FAUX		VRAI	Est effectivement punie d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans toute personne qui a des rapports sexuels dans le but de transmettre la maladie (Voir article 48 de la Loi VIH)
162.	0	L'infection à VIH peut se contracter par une piqûre de moustique	VRAI	FAUX		FAUX	
163.	0	Le préservatif peut être utilisé plusieurs fois si on le lave après chaque rapport	VRAI	FAUX		FAUX	Le préservatif est à usage unique !
164.	0	On peut davantage se protéger de l'infection à VIH en doublant le préservatif	VRAI	FAUX		FAUX	Au contraire ! Doubler les préservatifs augmente le risque de déchirure du préservatif.
165.	0	On peut éviter la déchirure du préservatif en y rajoutant de la salive	VRAI	FAUX		FAUX	N'utilise jamais ta salive comme lubrifiant ! Au besoin, achète un lubrifiant à base d'eau en pharmacie. <b>Nb : le préservatif est vendu lubrifié.</b>

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
166.	0	On peut utiliser de l'huile ou le beurre de karité comme lubrifiant pour le préservatif	VRAI	FAUX		FAUX	N'utilises jamais de l'huile ou le beurre de karité comme lubrifiant! Au besoin, achète un lubrifiant en pharmacie. <b>Nb : le préservatif est vendu lubrifié.</b>
167.	0	Le rapport sexuel non protégé avec coït interrompu n'est pas un comportement à risque d'infection à VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Le coït interrompu n'est ni une méthode fiable de contraception, ni une méthode de prévention du VIH et des autres IST car le liquide séminal peut contenir le virus.
168.	0	Avoir un rapport sexuel non protégé est une preuve d'amour	VRAI	FAUX		FAUX	Bien au contraire! Tout rapport sexuel non protégé expose les deux partenaires aux IST, au VIH et au Sida
169.	0	Il existe un vaccin contre l'infection à VIH	VRAI	FAUX		FAUX	
170.	0	Une personne infectée sous traitement ARV a une espérance de vie de trois à dix ans maximum	VRAI	FAUX		FAUX	Bien au contraire ! Elle peut vivre normalement et aussi longtemps qu'une personne non infectée.
171.	0	Le sida se guérit avec des traitements traditionnels	VRAI	FAUX		FAUX	Le sida ne se guérit pas ! A ce jour, seul les ARV sont utilisés dans le cadre du traitement du sida.
172.	0	Les ARV peuvent se prendre sans l'avis de l'agent de santé	VRAI	FAUX		FAUX	Ces médicaments sont prescrits par un agent de santé habilité à la suite de tout test de VIH Positif.
173.	0	Une personne séropositive peut partager ses ARV avec une autre	VRAI	FAUX		FAUX	
174.	0	Le physique d'une personne permet de savoir si elle est infectée par le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	L'apparence d'une personne ne révèle pas son statut sérologique. Seul le test de dépistage du VIH permet de savoir si on est infecté ou pas.
175.	0	Le sida est une maladie qui touche uniquement les pauvres	VRAI	FAUX		FAUX	Les pauvres comme les riches, les personnes à faible ou à forte corpulence peuvent être infectées par le VIH. Ne te laisse

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
							ni influencer par le statut ni par le physique de ton partenaire
176.	0	Le préservatif est seulement réservé aux personnes de mauvaise moralité	VRAI	FAUX		FAUX	Bien au contraire ! Le préservatif te protège donc l'utiliser est un acte responsable.
177.	0	L'infection à VIH ne touche que les travailleurs du sexe	VRAI	FAUX		FAUX	Non ! c'est un risque réel pour tous, d'où l'intérêt d'avoir des comportements à moindre risque.
178.	0	L'infection à VIH ne touche que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes.	VRAI	FAUX		FAUX	C'est un risque réel pour chacun de nous, d'où l'intérêt d'avoir des comportements à moindre risque.
179.	0	L'infection à VIH ne touche que les utilisateurs de drogues injectables	VRAI	FAUX		FAUX	C'est effectivement faux ! le risque d'infection à VIH est réel pour tous, d'où l'intérêt d'avoir des comportements à moindre risque.
180.	0	Le VIH se transmet en partageant le même banc qu'une personne infectée	VRAI	FAUX		FAUX	Il se transmet plutôt par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide séminal et le lait maternel.
181.	0	Le VIH se contracte en partageant un repas avec une personne vivant avec le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Il se transmet plutôt par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide séminal et le lait maternel.
182.	0	Une personne exigeant le préservatif à son ou sa partenaire est infidèle	VRAI	FAUX		FAUX	Le préservatif permet d'éviter le VIH, les IST et les grossesses non désirées. Son usage est un acte responsable et non un signe d'infidélité.
183.	0	On peut se passer du préservatif avec un ou une partenaire vierge/ puceau	VRAI	FAUX		FAUX	On peut contracter le VIH lors du premier rapport sexuel s'il n'est pas protégé.
184.	0	Une fille vierge peut avoir des rapports non protégés et ne pas attraper le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	On peut contracter le VIH lors du premier rapport sexuel s'il n'est pas protégé.
185.	0	On peut arrêter d'utiliser le préservatif dès qu'on entame une relation sérieuse	VRAI	FAUX		FAUX	Mieux vaut prévenir que guérir! Tout rapport sexuel non protégé

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
							est un rapport à risque d'infection à VIH.
186.	0	L'usage du préservatif empêche le plaisir pendant les rapports sexuels	VRAI	FAUX		FAUX	
187.	0	Le VIH se contracte en utilisant les mêmes toilettes, assiettes, chaises, etc. avec une personne vivant avec le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	Il se transmet plutôt par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide séminal et le lait maternel.
188.	0	Exiger le préservatif à son ou sa partenaire cela est un manque de confiance	VRAI	FAUX		FAUX	Le préservatif permet d'éviter le VIH, les IST et les grossesses non désirées. Son usage est plutôt un acte responsable.
189.	0	Si je pratique l'abstinence jusqu'à la fin de mes études, je serai malade	VRAI	FAUX		FAUX	L'abstinence n'a jamais été une cause de maladie, bien au contraire elle permet d'éviter les IST, le VIH et les grossesses précoces
190.	0	L'abstinence n'améliore pas l'estime de soi	FAUX	VRAI		FAUX	
191.	0	Si ton/ta camarade te confie qu'il ou elle est séropositif(ve) au VIH, tu n'as pas le droit de divulguer son statut	VRAI	FAUX		VRAI	Si une personne séropositive se confie à toi, elle mérite ta discrétion et ton soutien ! toute divulgation sans consentement est punie par la loi.
192.	0	L'éducateur a le droit d'obtenir des faveurs sexuelles de ses élèves	VRAI	FAUX		FAUX	Non ! C'est du harcèlement sexuel envers ses élèves. Il ne faut pas l'accepter mais le dénoncer à tout prix aux autorités ou appeler le 107.
193.	0	Un enfant infecté par le VIH n'a pas le droit d'aller à l'école	VRAI	FAUX		FAUX	Le droit à l'éducation est pour tous !
194.	0	Une poignée de main peut transmettre le VIH	VRAI	FAUX		FAUX	
<b>TUBERCULOSE</b>							
<b>TUBERCULOSE - Diagnostics clinique et biologique</b>							
195.	1	Qu'est-ce que la tuberculose ?	Maladie infectieuse, contagieuse, transmissible due à une bactérie appelé bacille de Koch ou BK	Maladie infectieuse, contagieuse, transmissible due à un parasite appelé bacille de Koch ou BK	Maladie infectieuse, contagieuse, transmissible due à un virus appelé bacille de Koch ou BK	1	

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
196.	1	Comment se transmet la tuberculose ?	Par une poignée de main	Par la voie aérienne	En mangeant avec le malade	2	Lors de la toux, le malade libère dans l'air de fines gouttelettes de crachats très riches en BK. Les voisins en le respirant peuvent se contaminer
197.	1	Parmi les signes de la tuberculose, on a :	La toux de plus de 2 semaines associée ou non à une Fièvre le soir	La toux isolée d'une semaine au moins	La toux de plus de 2 jours associées obligatoirement à une Fièvre	1	La durée de la toux considérée de plus de 2 semaines est le signe majeur mais il peut être associé à 5 autres signes : Sueurs la nuit, amaigrissement, un manque d'appétit, une Fatigue intense, une absence des règles chez la femme qui n'est pas enceinte. La présence de ces signes associés ou non à la toux doit cependant faire rechercher la TB
198.	1	Le signe le plus important de la tuberculose est	La toux de plus deux semaines	Fièvre le soir ou l'après midi	L'absence de règles chez la femme	1	En effet, la TB débute toujours par le poumon dans 95% des cas.
199.	0	Toute personne qui tousse depuis plus de 2 semaines est atteinte d'une tuberculose pulmonaire.	VRAI	FAUX		FAUX	Devant une toux de plus de 2 semaines il faut se rendre à l'hôpital pour un examen de crachat qui est le moyen de dépistage de la TB pulmonaire.
200.	0	La Tuberculose peut cacher le VIH/SIDA et l'un ou l'autre.	VRAI	FAUX		FAUX	
201.	1	L'examen de crachat est gratuit en Côte d'Ivoire	après que le diagnostic de la tuberculose ait été posé	avant que le diagnostic de la tuberculose ait été posé	avant et après que le diagnostic de la tuberculose ait été posé	1	La gratuité n'est appliquée qu'après que le diagnostic ait été posé. Le 1 <sup>er</sup> examen permet de rechercher la tuberculose. Les frais de 1000F CFA restent à la charge du malade
202.	0	La tuberculose touche principalement les poumons	VRAI	FAUX		VRAI	Il se développe là où il y a de l'oxygène.
203.	1	La tuberculose ne touche que :	Os, colonne vertébrale, peau, rein, cœur, muscle, intestin, testicules	La tuberculose ne se localise que dans le poumon	En plus du poumon la tuberculose peut toucher Os, colonne vertébrale, peau, rein, cœur, muscle, intestin, testicules	3	Oui la tuberculose commence toujours par le poumon mais peut se localiser ensuite partout dans les autres organes
204.	0	La tuberculose se guérit	VRAI	FAUX		VRAI	En 6 mois de traitement bien conduit et 9 pour les formes compliquées.

N	F	QUESTION	C1	C2	C3	BR	CONSEIL
205.	1	TBMR signifie	Tuberculose multi résistante	Tuberculose avec un mauvais retraitement	Tuberculose multi retraitée	1	
206.	0	Une tuberculose mal traitée conduit à la mort.	VRAI	FAUX		VRAI	
<b>TUBERCULOSE - Prévention</b>							
207.	0	En toussant dans un mouchoir je protège mon entourage de la tuberculose et d'autres maladies respiratoires.	VRAI	FAUX		VRAI	En toussant ou en éternuant j'éternue dans l'air des gouttes de crachats contenant des microbes susceptibles de contaminer mon entourage.
208.	1	J'évite de transmettre la tuberculose ...	En toussant dans les paumes de mes mains si je n'ai pas de mouchoir	En toussant dans un mouchoir ou dans le pli du coude ou dans le pan de mon habit	En toussant uniquement dans un mouchoir	2	
209.	0	Pour prévenir la tuberculose grave chez l'enfant on fait le Vaccin BCG à la naissance	VRAI	FAUX		VRAI	L'enfant peut faire la tuberculose simple même s'il est vacciné. Le BCG protège contre les formes graves.
210.	0	le BCG n'empêche pas la survenue de la tuberculose.	VRAI	FAUX		VRAI	Le BCG ne protège que des formes graves de la tuberculose chez l'enfant
211.	1	Il faut rechercher autour du malade des cas contacts pour...	le dépistage des autres cas autour du malade	pour rassurer le malade et sa famille	pour rechercher des cas graves autour du malade	1	Ceci pour rompre la chaîne de transmission de la tuberculose. Un malade contamine environ 10 à 15 cas autour de lui chaque année
212.	0	Chaque personne doit aider le malade à prendre correctement son médicament.	Vrai	FAUX		VRAI	Pour l'aider à guérir et éviter les cas compliqués de la tuberculose
213.	0	IL n'y a aucune différence entre la tuberculose infection et la tuberculose maladie	VRAI	FAUX		FAUX	En effet, la TB infection est provoquée par la vaccination BCG. La TB maladie est déclenchée par les facteurs favorisants et nous conduit à l'hôpital pour être soigné
214.	1	Le BCG veut dire	bacille de Calmette et Guérin	bien conserver le germe de la tuberculose	bacille qui calme et guérit de la tuberculose	1	Le BCG est un vaccin il est administré à l'enfant dès la naissance à un poids de 2500g au minimum
215.	1	Le traitement de la tuberculose se fait ....	uniquement à Abidjan	partout en Côte d'Ivoire	chez les guérisseurs	2	Les centres diagnostiques et de traitement sont présents sur toute l'étendue du territoire nationale

